



**Unité des Communes valdôtaines Walser**  
**Union der Aostataler Walsergemeinden**  
**Unione dei Comuni valdostani Walser**

*Regione Autonoma Valle d'Aosta - Autonome Region Aostatal*  
*Région Autonome Vallée d'Aoste*

---

**PROCEDURA SELETTIVA PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 OPERATORI SPECIALIZZATI A TEMPO PIENO (CAT.B – POS. B2S), PROFILO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO, NELL'AMBITO DELL'ORGANICO DELL'UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES WALSER**

**PROVA TEORICO-PRATICA**

**TRACCIA N. 1**

1. Si considera normale il valore della glicemia a digiuno che viene mantenuto tra:
  - a. 70 e 100 mg/dl
  - b. 150 e 200 mg/dl
  - c. 30 e 60 mg/dl
  
2. Il lavaggio sociale delle mani con acqua e sapone è finalizzato alla rimozione:
  - a. Della flora batterica residente.
  - b. Dello sporco e della flora batterica transitoria
  - c. Nessuna delle precedenti
  
3. Le infezioni correlate all'assistenza sono infezioni acquisite e possono verificarsi in ogni ambito assistenziale, inclusa la degenza in ospedale ed in struttura residenziale.
  - a. Vero
  - b. Vero solamente per le infezioni correlate al Covid-19
  - c. Falso
  
4. L'uso dei guanti riduce la necessità e la frequenza del lavaggio delle mani:
  - a. Falso
  - b. Vero
  - c. Vero solamente in assenza dell'infezione da Coronavirus
  
5. I percorsi "pulito" e "sporco" devono essere necessariamente essere sempre distinti:
  - a. Vero
  - b. Falso
  - c. Vero solamente nell'assistenza erogata in ambito ospedaliero

6. La pulizia del cavo orale nella persona portatrice di protesi dentaria deve essere effettuata:
  - a. Dopo aver rimosso la protesi
  - b. Senza rimuovere la protesi
  - c. Prima di rimuovere la protesi
  
7. Per effettuare correttamente l'igiene perineale nell'uomo (se non circonciso):
  - a. Si deve scoprire il prepuzio
  - b. Non si deve scoprire il prepuzio
  - c. È indifferente
  
8. Laddove l'utente segnala dolore persistente, l'OSS:
  - a. Rileva la sede e l'intensità
  - b. Rileva la sede, l'intensità e lo comunica prontamente all'Infermiere e/o al Medico
  - c. Rassicura l'utente
  
9. La sacca di raccolta delle urine deve essere mantenuta:
  - a. Al livello della vescica
  - b. Al di sopra del livello della vescica
  - c. Al di sotto del livello della vescica
  
10. Al fine di prevenire le infezioni urinarie catetere correlate in un paziente con catetere vescicale bisogna osservare che:
  - a. La sacca sia sempre collegata al catetere urinario
  - b. La sacca sia sempre al di sotto della vescica
  - c. Tutte le precedenti
  
11. Il segreto professionale:
  - a. È un obbligo che l'equipe Medica ed Infermieristica deve osservare
  - b. È un obbligo che l'equipe Medica e riabilitativa deve osservare
  - c. È un obbligo che tutta l'equipe Sanitaria, OSS compresi, deve osservare
  
12. Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono su diversi organi ed apparati, individuate tra quelli elencati quello non corretto:
  - a. Cute
  - b. Apparato muscolo-scheletrico
  - c. Stomaco

13. Le lesioni da compressione sono:
- Le lesioni che interessano solamente gli strati superficiali della cute
  - Le lesioni che interessano tutti gli strati cutanei e che possono interessare anche il tessuto muscolare e quello osseo
  - Le lesioni che interessano solamente i muscoli e le ossa
14. Le lesioni da compressione sono il risultato di fattori organici e locali:
- Immobilità, età, malattie arteriose, alimentazione e idratazione inadeguate
  - Malattie arteriose, alimentazione e idratazione inadeguate
  - Alimentazione inadeguata, età ed immobilità
15. Nell'assistenza al paziente demente:
- L'OSS favorisce il mantenimento delle abilità residue degli utenti
  - L'OSS sostituisce integralmente all'utente
  - LOSS stimola il care-giver nel processo di sostituzione dell'utente
16. La mobilizzazione passiva consiste:
- Nel movimento di parti del corpo senza contrazione volontaria dei muscoli da parte del paziente
  - Nel movimento di parti del corpo con contrazione volontaria dei muscoli da parte del paziente
  - Nel movimento dell'utente durante la deambulazione
17. I valori della pressione arteriosa secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute considerati normali sono:
- 80 mm Hg (sistolica) e 50 mm Hg (diastolica)
  - 120 mm Hg (sistolica) e 80 mm Hg (diastolica)
  - 160 mm Hg (sistolica) e 100 mm Hg (diastolica)
18. Alcuni pazienti possono presentare alterazioni del processo di deglutizione, quale intervento risulta scorretto laddove è presente la disfagia:
- Modificare la consistenza degli alimenti secondo la prescrizione
  - Somministrare l'acqua in buona quantità durante il pasto utilizzando l'acqua naturale o frizzante
  - Far eseguire, ogni due o tre deglutizioni, colpi di tosse ed invitare a deglutire la saliva dopo aver tossito

19. La riduzione della diuresi può essere influenzata da:
- Sudorazione profusa e ritenzione idrica
  - Scarsa assunzione di liquidi
  - Entrambe le precedenti
20. Le linee guida dell'istituto Nazionale della Nutrizione raccomandano l'adesione a specifici comportamenti, quali tra quelli indicati è scorretto:
- Variare spesso la scelta degli alimenti
  - Implementare il consumo di cereali, frutta e verdura
  - Aumentare l'assunzione di zuccheri
21. La sequenza corretta dell'ABC della rianimazione è:
- Assicurare la pervietà delle vie aeree, garantire la ventilazione, garantire la circolazione
  - Garantire la circolazione, assicurare la pervietà delle vie aeree e garantire la ventilazione
  - Garantire la ventilazione, garantire la circolazione, assicurare la pervietà delle vie aeree
22. Individua il criterio corretto per identificare l'anziano fragile:
- Età medio-avanzata
  - Età estremamente avanzata
  - Età avanzata associata a disabilità e comorbidità
23. Individua l'intervento scorretto nell'assistenza all'anziano con stipsi:
- Aumentare l'apporto di scorie nella dieta
  - Limitare l'apporto di liquidi
  - Favorire l'attività motoria
24. Quali tra i dispositivi elencati non sono inclusi tra i mezzi di contenzione:
- Dispositivi di allarme al letto ed alle porte
  - Cintura per carrozzina o sedia
  - Spondine che proteggono metà o tre quarti del letto
25. La mascherina chirurgica va indossata:
- Coprendo la bocca
  - Coprendo il naso e la bocca
  - Coprendo naso, bocca laddove l'operatore presenta una sindrome da raffreddamento

26. Non è una complicanza dell'allettamento prolungato:
- La polmonite
  - La tromboflebite
  - La gastrite
27. La stomia o stoma è l'aboccamento temporaneo o definitivo di un viscere alla superficie con l'obiettivo di:
- Permettere la fuoriuscita del contenuto viscerale
  - Introdurre sostanze ai fini nutrizionali o terapeutici
  - Entrambe le precedenti
28. Individua la sequenza corretta per l'esecuzione dell'igiene della ileostomia:
- Effettuare il lavaggio sociale delle mani ed indossare i guanti monouso, rimuovere il sacchetto dall'alto verso il basso, effettuare l'igiene con acqua tiepida, panno monouso, sapone isocutaneo ed asciugare tamponando
  - Effettuare il lavaggio antisettico delle mani ed indossare i guanti monouso, rimuovere il sacchetto dal basso verso l'alto, effettuare l'igiene con acqua calda, panno monouso, sapone ed asciugare tamponando
  - Effettuare il lavaggio sociale delle mani ed indossare i guanti sterili, rimuovere il sacchetto dal basso verso l'alto, effettuare l'igiene con acqua tiepida, panno monouso, sapone ed asciugare frizionando
29. Individua la sequenza corretta per l'assistenza all'utente portatore di PEG:
- Entrambe le successive
  - Monitoraggio quotidiano dell'integrità della cute peristomale
  - Sorveglianza durante la somministrazione del pasto, segnalando all'infermiere l'insorgenza di sintomi quali la nausea, il vomito, l'alterazione della coscienza e tosse
30. L'utente portatore di sondino naso-gastrico richiede:
- L'effettuazione dell'igiene del cavo orale a giorni alterni
  - L'effettuazione dell'igiene del cavo orale almeno due volte al giorno
  - L'effettuazione dell'igiene del cavo orale una volta a settimana



**Unité des Communes valdôtaines Walser**  
**Union der Aostataler Walsergemeinden**  
**Unione dei Comuni valdostani Walser**

*Regione Autonoma Valle d'Aosta - Autonome Region Aostatal*  
*Région Autonome Vallée d'Aoste*

---

**PROCEDURA SELETTIVA PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 OPERATORI SPECIALIZZATI A TEMPO PIENO (CAT.B – POS. B2S), PROFILO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO, NELL'AMBITO DELL'ORGANICO DELL'UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES WALSER**

**PROVA TEORICO-PRATICA**

**TRACCIA N. 2**

1. Quando si effettua la medicazione semplice:
  - a. Si indossano i guanti monouso, si rimuove la medicazione precedente e si fissa con il cerotto medicato
  - b. Si indossano i guanti monouso, si disinfetta l'area interessata, si applica la garza sterile
  - c. Si indossano i guanti monouso, si rimuove la medicazione precedente, si disinfetta l'area interessata, si applica la garza sterile e si fissa con il cerotto
  
2. Il valore considerato normale della glicemia a digiuno è:
  - a. Tra 70 e 100 mg/dl
  - b. Tra 150 e 200 mg/dl
  - c. Tra 40 e 70 mg/dl
  
3. Le infezioni correlate all'assistenza sono infezioni acquisite e possono verificarsi in ogni ambito assistenziale, inclusa la degenza in ospedale ed in struttura residenziale.
  - a. Vero
  - b. Vero solamente per le infezioni correlate al Covid-19
  - c. Falso
  
4. L'uso dei guanti riduce la necessità e la frequenza del lavaggio delle mani:
  - a. Falso
  - b. Vero
  - c. Vero solamente in assenza dell'infezione da Coronavirus.
  
5. La demenza senile è caratterizzata da:
  - a. Entrambe le risposte successive
  - b. Cambiamenti di umore
  - c. Confusione riguardo al tempo ed al luogo in cui ci si trova

6. La pulizia del cavo orale nella persona portatrice di protesi dentaria deve essere effettuata:
  - a. Dopo aver rimosso la protesi
  - b. Senza rimuovere la protesi
  - c. Prima di rimuovere la protesi
  
7. Per effettuare correttamente l'igiene perineale nell'uomo (se non circonciso):+
  - a. Si deve scoprire il prepuzio
  - b. Non si deve scoprire il prepuzio
  - c. È indifferente
  
8. L'igiene della zona rettale deve essere effettuata procedendo dall'ano verso lo scroto nell'uomo e dall'ano verso la vagina nella donna:
  - a. Vero
  - b. Falso
  - c. È indifferente
  
9. La sacca di raccolta delle urine deve essere mantenuta:
  - a. Al livello della vescica
  - b. Al di sopra del livello della vescica
  - c. Al di sotto del livello della vescica
  
10. Al fine di prevenire le infezioni urinarie catetere correlate in un paziente con catetere vescicale bisogna osservare che:
  - a. La sacca sia sempre collegata al catetere urinario
  - b. La sacca sia sempre al di sotto della vescica
  - c. Tutte le precedenti
  
11. Laddove l'utente segnala dolore persistente, l'OSS:
  - a. Rileva la sede e l'intensità
  - b. Rileva la sede, l'intensità e lo comunica prontamente all'Infermiere e/o al Medico
  - c. Rassicura l'utente
  
12. Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono su diversi organi ed apparati, individuate su quelli elencati quello non corretto:
  - a. Cute
  - b. Apparato muscolo-scheletrico
  - c. Stomaco

13. Le lesioni da compressione sono:
- Le lesioni che interessano solamente gli strati superficiali della cute
  - Le lesioni che interessano tutti gli strati cutanei e che possono interessare anche il tessuto muscolare e quello osseo
  - Le lesioni che interessano solamente i muscoli e le ossa
14. Le lesioni da compressione sono il risultato di fattori organici e locali:
- Immobilità, età, malattie arteriose, alimentazione e idratazione inadeguate
  - Età, alimentazione e idratazione inadeguate
  - Alimentazione e idratazione inadeguate, immobilità
15. Durante la somministrazione del pasto l'OSS rileva l'insorgenza improvvisa della tosse e voce modificata, pertanto:
- Sospende la somministrazione del pasto e sollecita l'utente nell'assunzione di un bicchiere d'acqua
  - Corregge la posizione seduta dell'utente e continua con la somministrazione del pasto, sollecitando l'utente ad assumere un bicchiere d'acqua frizzante
  - Sospende immediatamente la somministrazione del pasto e avvisa precocemente l'Infermiere
16. La prevenzione delle cadute si effettua attraverso:
- La progressiva eliminazione delle barriere architettoniche, in aggiunta ad interventi personalizzati finalizzati anche al mantenimento delle abilità residue in sicurezza
  - Interventi personalizzati per l'utilizzo delle contenzioni fisiche
  - Eliminazione dei tappeti
17. Rispetto al controllo della diuresi l'OSS deve rilevare:
- Il colore, l'odore, la trasparenza e la quantità
  - Il numero delle minzioni
  - Durata delle minzioni
18. Alcuni pazienti possono presentare alterazioni del processo di deglutizione: disfagia; quale intervento risulta scorretto:
- Modificare la consistenza degli alimenti secondo la prescrizione
  - Somministrare l'acqua in buona quantità durante il pasto utilizzando l'acqua naturale o frizzante
  - Far eseguire, ogni due o tre deglutizioni, colpi di tosse ed invitare a deglutire la saliva dopo aver tossito

19. La persona diabetica deve assumere con moderazione:
- Frutta e verdura
  - Il pollo
  - Patate e carote
20. Le linee guida dell'istituto Nazionale della Nutrizione raccomandano l'adesione a specifici comportamenti, quali tra quelli indicati è scorretto:
- Variare spesso la scelta degli alimenti
  - Implementare il consumo di cereali frutta e verdura
  - Ridurre l'assunzione di scorie e liquidi
21. La sequenza corretta dell'ABC della rianimazione è:
- Assicurare la pervietà delle vie aeree, garantire la ventilazione, garantire la circolazione
  - Assicurare la pervietà delle vie aeree e garantire la circolazione
  - Garantire la ventilazione e assicurare la pervietà delle vie aeree
22. La demenza senile è caratterizzata da:
- Confusione riguardo al tempo ed al luogo in cui ci si trova
  - Cambiamenti d'umore
  - Entrambe le precedenti
23. Individua l'intervento scorretto nell'assistenza all'anziano con stipsi:
- Aumentare l'apporto di scorie nella dieta
  - Limitare l'apporto di liquidi
  - Favorire l'attività motoria
24. Quali tra i dispositivi elencati non sono inclusi tra i mezzi di contenzione:
- Dispositivi di allarme al letto ed alle porte
  - Cintura per carrozzina o sedia
  - Spondine che proteggono metà o tre quarti del letto
25. I percorsi "pulito" e "sporco" devono essere necessariamente essere sempre distinti:
- Vero
  - Falso
  - Vero solamente nell'assistenza erogata in ambito ospedaliero

26. La mascherina chirurgica va indossata:

- a. Coprendo la bocca
- b. Coprendo il naso e la bocca
- c. Sono entrambe valide

27. La stomia o stoma è l'aboccamento temporaneo o definitivo di un viscere alla superficie con l'obiettivo di:

- a. Permettere la fuoriuscita del contenuto viscerale
- b. Introdurre sostanze ai fini nutrizionali o terapeutici
- c. Entrambe le precedenti

28. Individua la sequenza corretta per l'esecuzione dell'igiene della ileostomia:

- a. Effettuare il lavaggio sociale delle mani ed indossare i guanti monouso, rimuovere il sacchetto dall'alto verso il basso, effettuare l'igiene con acqua tiepida, panno monouso, sapone isocutaneo ed asciugare tamponando
- b. Effettuare il lavaggio antisettico delle mani ed indossare i guanti monouso, rimuovere il sacchetto dal basso verso l'alto, effettuare l'igiene con acqua calda, panno monouso, sapone ed asciugare tamponando.
- c. Effettuare il lavaggio sociale delle mani ed indossare i guanti sterili, rimuovere il sacchetto dall'alto verso il basso, effettuare l'igiene con acqua calda, panno monouso, sapone ed asciugare frizionando.

29. Individua la sequenza corretta per l'assistenza all'utente portatore di PEG:

- a. Entrambe le successive
- b. Monitoraggio e detersione quotidiana della cute attorno alla stomia
- c. Sorveglianza durante la somministrazione del pasto, segnalando all'infermiere l'insorgenza di sintomi quali la nausea, il vomito, l'alterazione della coscienza e tosse.

30. I valori della pressione arteriosa secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute considerati normali sono:

- a. 80 mm Hg (sistolica) e 50 mm Hg (diastolica)
- b. 120 mm Hg (sistolica) e 80 mm Hg (diastolica)
- c. 160 mm Hg (sistolica) e 100 mm Hg (diastolica)



**Unité des Communes valdôtaines Walser**  
**Union der Aostataler Walsergemeinden**  
**Unione dei Comuni valdostani Walser**

*Regione Autonoma Valle d'Aosta - Autonome Region Aostatal*  
*Région Autonome Vallée d'Aoste*

---

**PROCEDURA SELETTIVA PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 OPERATORI SPECIALIZZATI A TEMPO PIENO (CAT.B – POS. B2S), PROFILO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO, NELL'AMBITO DELL'ORGANICO DELL'UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES WALSER**

**PROVA TEORICO-PRATICA**

**TRACCIA N. 3**

1. I valori della pressione arteriosa secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute considerati normali sono :
  - a. 80 mm Hg (sistolica) e 50 mm Hg (diastolica)
  - b. 120 mm Hg (sistolica) e 80 mm Hg (diastolica)
  - c. 160 mm Hg (sistolica) e 100 mm Hg (diastolica)
  
2. Il lavaggio sociale delle mani con acqua e sapone è finalizzato alla rimozione:
  - a. Della flora batterica residente
  - b. Dello sporco e della flora batterica transitoria
  - c. Nessuna delle precedenti
  
3. Il valore normale della glicemia a digiuno è:
  - a. Tra 70 e 100 mg/dl
  - b. Tra 150 e 200 mg/dl
  - c. Tra 30 e 60 mg/dl
  
4. La pulizia del cavo orale nella persona portatrice di protesi dentaria deve essere effettuata:
  - a. Dopo aver rimosso la protesi
  - b. Senza rimuovere la protesi
  - c. Prima di rimuovere la protesi
  
5. Per effettuare correttamente l'igiene perineale nell'uomo (se non circonciso):
  - a. Si deve scoprire il prepuzio
  - b. Non si deve scoprire il prepuzio
  - c. È indifferente

6. L'igiene della zona rettale deve essere effettuata procedendo dallo scroto verso l'ano nell'uomo e dalla vagina verso l'ano nella donna:

- a. Vero
- b. Falso
- c. È indifferente

7. Con il termine relazione d'aiuto s'intende:

- a. La relazione di collaborazione che si instaura tra gli operatori della salute
- b. La relazione di collaborazione che si instaura tra gli utenti di una Struttura
- c. Il legame costruttivo, caratterizzato da ascolto attivo e presenza autentica che si instaura tra utente e operatore, nel percorso di crescita e adattamento

8. Al fine di prevenire le infezioni urinarie catetere correlate in un paziente con catetere vescicale bisogna osservare che:

- a. La sacca sia sempre collegata al catetere urinario
- b. La sacca sia sempre al di sotto della vescica
- c. Tutte le precedenti

9. Il segreto professionale:

- a. È un obbligo che l'equipe Medica ed Infermieristica deve osservare
- b. È un obbligo che l'equipe Medica e Riabilitativa deve osservare
- c. È un obbligo che tutta l'Equipe Sanitaria, OSS compresi, deve osservare

10. Per poter effettuare il bagno a letto quale dei kit elencati è corretto:

- a. Asciugamani, salviette monouso, prodotto specifico per l'igiene
- b. Bacinella/catino, asciugamani, salviette monouso, prodotto specifico per l'igiene
- c. Bacinella/catino, padella, asciugamani, traverse monouso, salviette monouso, prodotto specifico per l'igiene, indumenti puliti

11. Le lesioni da compressione sono:

- a. Le lesioni che interessano solamente gli strati superficiali della cute
- b. Le lesioni che interessano tutti gli strati cutanei e che possono interessare anche il tessuto muscolare e quello osseo
- c. Le lesioni che interessano solamente i muscoli e le ossa

12. Le lesioni da compressione sono il risultato di fattori organici e locali:
- Immobilità, età, malattie arteriose, alimentazione e idratazione inadeguate
  - Malattie arteriose, alimentazione e idratazione inadeguate
  - Alimentazione e idratazione inadeguate, immobilità
13. Cosa sono le abilità residue:
- Stato di salute della persona
  - Abilità che la persona mantiene in autonomia
  - Abilità nella deambulazione
14. Quando si sposta nel letto una persona si devono compiere le seguenti azioni esclusa una:
- Evitare trazioni alle articolazioni
  - Trazionare i cateteri
  - Evitare posizioni viziate
15. Nel paziente portatore di catetere vescicale:
- Il sacchetto di raccolta deve stare più basso rispetto al bacino
  - Il sacchetto di raccolta deve stare più alto rispetto al bacino
  - Nessuna delle precedenti
16. Alcuni pazienti possono presentare alterazioni del processo di deglutizione: quale intervento non risulta corretto in presenza di disfagia:
- Modificare la consistenza degli alimenti secondo la prescrizione logopedica
  - Somministrare l'acqua in buona quantità durante il pasto utilizzando l'acqua naturale o frizzante
  - Posturare correttamente l'utente durante l'alimentazione secondo la prescrizione logopedica
17. La persona diabetica deve assumere con moderazione:
- Frutta e verdura
  - Il pollo
  - Patate e carote
18. Le linee guida dell'istituto Nazionale della Nutrizione raccomandano l'adesione a specifici comportamenti, quali tra quelli indicati è scorretto:
- Variare spesso la scelta degli alimenti
  - Aumentare il consumo di cereali frutta e verdura
  - Implementare l'assunzione di zuccheri

19. La sequenza corretta dell'ABC della rianimazione è:
- Assicurare la pervietà delle vie aeree, garantire la ventilazione, garantire la circolazione
  - Garantire la circolazione e garantire la ventilazione
  - Garantire la ventilazione, e assicurare la pervietà delle vie aeree
20. Individua il criterio corretto per identificare l'anziano fragile:
- Età medio-avanzata
  - Età estremamente avanzata
  - Età avanzata associata a disabilità e comorbilità
21. Individua l'intervento corretto nell'assistenza all'anziano con stipsi:
- Aumentare l'apporto di scorie e liquidi nella dieta
  - Limitare l'apporto di liquidi
  - Limitare l'attività motoria
22. Quali tra i dispositivi elencati non sono inclusi tra i mezzi di contenzione
- Dispositivi di allarme al letto ed alle porte
  - Cintura per carrozzina o sedia
  - Spondine che proteggono metà o tre quarti del letto
23. Se una persona si sente svenire è necessario:
- Alzarle le braccia
  - Posizionarla in posizione ortostatica
  - Sdraiarla supina, con qualcosa di morbido sotto la testa
24. La riduzione della diuresi può essere influenzata da:
- Sudorazione profusa e ritenzione idrica
  - Scarsa assunzione di liquidi
  - Entrambe le precedenti
25. La stomia o stoma è l'aboccamento temporaneo o definitivo di un viscere alla superficie con l'obiettivo di:
- Permettere la fuoriuscita del contenuto viscerale
  - Introdurre sostanze ai fini nutrizionali o terapeutici
  - Entrambe le precedenti

26. Individua la sequenza corretta per l'esecuzione dell'igiene della ileostomia:

- a. Effettuare il lavaggio sociale delle mani ed indossare i guanti monouso, rimuovere il sacchetto dall'alto verso il basso, effettuare l'igiene con acqua tiepida, panno monouso, sapone isocutaneo ed asciugare tamponando
- b. Effettuare il lavaggio antisettico delle mani ed indossare i guanti monouso, rimuovere il sacchetto dal basso verso l'alto, effettuare l'igiene con acqua calda, panno monouso, sapone ed asciugare tamponando.
- c. Effettuare il lavaggio sociale delle mani ed indossare i guanti sterili, rimuovere il sacchetto dall'alto verso il basso, effettuare l'igiene con acqua calda, panno monouso, sapone isocutaneo ed asciugare frizionando.

27. Individua la sequenza corretta per l'assistenza all'utente portatore di PEG:

- a. Entrambe le successive
- b. Monitorare e detergere quotidianamente la cute peristomale
- c. Sorveglianza durante la somministrazione del pasto, segnalando all'infermiere l'insorgenza di sintomi quali la nausea, il vomito, l'alterazione della coscienza e tosse

28. La mobilizzazione passiva consiste:

- a. Nel movimento di parti del corpo senza contrazione volontaria dei muscoli da parte del paziente
- b. Nel movimento di parti del corpo con contrazione volontaria dei muscoli da parte del paziente
- c. Nel movimento dell'utente durante la deambulazione

29. Quando si rinnova la medicazione semplice:

- a. Si indossano i guanti monouso, si rimuove la medicazione precedente e si fissa con il cerotto medicato
- b. Si indossano i guanti monouso, si disinfetta l'area interessata, si applica la garza sterile
- c. Si indossano i guanti monouso, si rimuove la medicazione precedente, si disinfetta l'area interessata, si applica la garza sterile e si fissa con il cerotto

30. Le infezioni correlate all'assistenza sono infezioni acquisite e possono verificarsi in ogni ambito assistenziale, inclusa la degenza in ospedale ed in struttura residenziale.

- a. Vero
- b. Vero solamente per le infezioni correlate al Covid-19
- c. Falso